

Código: DVZ228

Número de inscrição no Registo em Portugal: 550/2023

CARACTERÍSTICAS

Formulação com cálcio complexo de elevada eficácia no controlo e prevenção de deficiências de cálcio, bem como para a correção das águas e solos salinos. Tem uma elevada concentração de agentes complexos com elevada atividade cambial entre cálcio e sódio. É um produto feito a partir de licores de sulfureto, de madeira conífera, sendo um produto biodegradável.

CONTEÚDO DECLARADO	% m/v	% m/m
Óxido de cálcio (CaO) total	14,4	10,6
Óxido de cálcio (CaO) solúvel em água	14,4	10,6
Óxido de cálcio (CaO) complexado por LS	14,4	10,6
<i>pH: 2,8. Intervalo de pH que garanta uma boa estabilidade da fracção complexada: pH entre 2,5 e 8,5</i>		
OUTROS CONTEÚDOS	% m/v	% m/m
Azoto (N) total	6,5	4,8
Azoto (N) nítrico	6,5	4,8

Condutividade elétrica (mS/cm): 51,5%

INDICAÇÃO DE CULTURAS, DOSES E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO ADEQUADAS

APLICAÇÃO		DOSES
Correção de águas salgadas	Água de irrigação	10-12 ml por unidade de RAS/SAR a rebaixar.
		Normalmente 25-75 ml/m ³ de água
Culturas em solos salinos	Irrigação por gotejamento	4-8 L/ha e semana para completar 50-80 L/ha
	Irrigação de superfície	7,5-15 L/ha e Irrigação para completar 100-150 L/ha
PREVENÇÃO E CONTROLE DE DEFICIÊNCIAS DE CÁLCIO		
Aplicação Foliar	Geral	175-250 ml/hl cada 10-15 dias
Aplicação em Fertirrega	Frutíferas Videira	5-8 L/ha a partir do coalhado para colheita
	Legumes Morango	2,5-4 L/ha a partir do coalhado para colheita

Utilizar-se somente no caso de reconhecida necessidade. Não ultrapassar as doses adequadas.

COMPATIBILIDADE

Não misturar com óleos minerais, ácidos fortes, cobre, fosfatos ou sulfatos. Em caso de dúvida, realice uma prova prévia.

INSTRUÇÕES REFERENTES À TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DURANTE A MESMA

Recomenda-se armazenar a temperaturas não inferiores à temperatura de cristalização. O produto envasado é estável durante pelo menos dois anos. Ver Ficha de Segurança.

CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

P102: Manter afastado do alcance de crianças.

P270: Não comer, beber, nem fumar durante a sua utilização.