

Código: MAA319

## CARACTERÍSTICAS

Formulação estável de cálcio, zinco e boro na forma de etanolamina, de fácil penetração na planta. Especialmente indicado para prevenir ou corrigir desequilíbrios causados por carências desses nutrientes. Além disso, induz a floração, a frutificação e o desenvolvimento do fruto, bem como melhora a qualidade pós-colheita.

| CONTEÚDO DECLARADO                                        | % p/v | % p/p |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|
| Óxido de cálcio (CaO) solúvel em água e complexado por AG | 13,4  | 10,0  |
| Boro (B) solúvel em água                                  | 1,3   | 1,0   |
| Zinco (Zn) complexado por AG                              | 1,3   | 1,0   |

*pH: 3,15. Intervalo de pH que garante uma boa estabilidade da fração complexada: pH entre 3 e 9*

## INDICAÇÃO DE CULTURAS, DOSES E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO ADEQUADAS

Recomendado para aplicação foliar e fertirrega nas seguintes doses:

| APLICAÇÃO    | DOSE                   |
|--------------|------------------------|
| Foliar*      | 2-3 L/ha por aplicação |
| Fertirrega** | 2-4 L/ha por aplicação |

\*Utilizar um volume mínimo de água de 200 L/ha.

\*\*Dose para sistemas de fertirrega por gotejamento, aspersão e pivô.

Utilizar apenas em caso de comprovada necessidade. Não exceder as doses de aplicação recomendadas.

## COMPATIBILIDADE

Não misturar com fosfatos, reações alcalinas e óleos minerais. Pode ser aplicado isoladamente ou em mistura com os produtos fitossanitários habituais. Em caso de dúvida, realizar uma prova prévia.

## INSTRUÇÕES REFERENTES À TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DURANTE A MESMA

Recomenda-se armazenar a temperaturas não inferiores à temperatura de cristalização. Para embalagens >25 kg, na ausência de meios mecânicos, manipule entre duas pessoas. Ver Ficha de Segurança.

## CONSELHOS DE PRUDÊNCIA

P102: Manter fora do alcance de crianças.

P270: Não comer, beber, nem fumar durante a sua utilização.